



TEMA 12: HIV Y SIDA

HIV Y SIDA

Pasos a seguir en paciente con SIDA

1. Extraer metales de boca. Después de unos días utilizar el zappicador en cada pieza de donde se ha retirado para eliminar metales residuales y para endurecer porosidades de las piezas plásticas (para evitar la continua toxicidad).
2. Utilizar productos bio en alimentación, cosmética e higiene.
3. Eliminar fuentes de benceno.
4. Beber y cocinar con agua procedente de destiladora u osmosis inversa.
5. Evitar lácteos, polo y pescado.

HIV Y SIDA

6. Evitar alimentos con floridcina, ácido clorogénico, apiol, y ácido gálico.
7. Añadir 15 gotas de HCL (5%) a la comida y comer con cubiertos plásticos.
8. 5 minutos antes de cada comida:
 - ◆ 1 cápsula de hierro (10mg)
 - ◆ 2 cápsulas B2 (de 300)
 - ◆ 2 cápsulas de óxido de magnesio (de 300)
 - ◆ Haremos otra toma en una pequeña merienda de 4 cápsulas de Vitamina B2.
9. 10 cápsulas de Q10 (400) antes del desayuno.
10. Comenzar zipper y platos de zappeo aproximadamente 8 horas diarias.

HIV Y SIDA

11. Tomar tintura de nogal (2 cucharadas soperas) + 7 cápsulas de ajenojo + 7 cápsulas de clavo
12. Pau d'arco: 2 cápsulas 2 veces al día, entre comidas.
13. Tomar gotas homeográficas
14. Selenio: 5 capsulas x3 veces al día
15. Hortensia: 2 cápsulas x3 veces al día
16. Escaramujo: 1 cápsula x3 veces al día
17. Vitamina C: 2 cápsulas x3 veces al día

HIV Y SIDA

18. Lugol: 6 gotas después de cada comida y antes de acostarse.
19. Completar protocolo de áscaris con cisteína (3 cápsulas de 500mg 2 veces al día)
20. 15 cápsulas de enzimas digestivas 2 veces al día entre comidas para digerir los parásitos muertos.
21. Aceite de oliva ozonizado (1 cucharada sopera 2 veces al día) para eliminar PCB's y eliminar huevos de áscaris.
22. Glutathione (500mg) 2 cápsulas x3 veces al día para ayudar a los pulmones y por su efecto reductor.

HIV Y SIDA

23. Betaína – HCL (300mg) 3 desayuno, comida y cena (para matar cloridium en el intestino).
24. Vitamina A: 10.000 unidades diarias.
25. Zinc (30mg): 1 cápsula con 1 comida.
26. Enema de lugol, alternando con tintura de nogal.
27. Pepsina 1 en cada comida + te de corteza de abedul 3 veces al día, para eliminar priones.
28. Ácido glucurónico 2 veces al día.
29. Ácido tiótico (250mg) 3 veces al día y taurina (500mg) 3 veces al día.

HIV Y SIDA

ZAPPEO

- ◆ Zapper regular 20-30 minutos varias veces al día
- ◆ Platos:
 - Set vascular
 - Médula ósea
 - Timo+ Set vascular / médula osea
Set vascular / timo
- ◆ + Si hay órgano con problema específico: set vascular / órgano
- ◆ + órganos genitales 1x1
 - Masculino: testículo izquierdo, testículo derecho, vaso deferente, pene, próstata, epidídimo, esperma
 - Femenino: ovario izquierdo, ovario derecho, fimbria, trompa de falopio, útero, cervix, vagina.

HIV Y SIDA

HOMEOGRAFÍAS (6 gotas 6 veces al día con 1 min. Mínimo de separación)

- ◆ Pineal
- ◆ Hipotálamo
- ◆ Pituitaria
- ◆ Fluido cerebro espinal
- ◆ Sangra
- ◆ Linfa
- ◆ Grupo L
- ◆ Timo
- ◆ Médula ósea

- ◆ BQ
- ◆ RZ
- ◆ G
- ◆ GA

Aunque también se pueden hacer de órganos para incrementar la producción de estas sustancias ejemplo: BQ/timo