

PATOLOGÍAS APARATO DIGESTIVO

GASTRITIS

ZAPPER (opcional):

- ◆ Zapper regular de 60 minutos continuos (a partir del 7º día de limpieza intestinal)
- ◆ Podemos añadir Zapping plates:
 - Estómago 20'
 - Esfínter gastroesofágico 20'

OBSERVACIONES:

Por supuesto, eliminar de la dieta ya que no dejan que se cierre bien el esfínter gastroesofágico:

- ◆ Azúcar (aumenta la secreción de HCL)
- ◆ Menta
- ◆ Té, Café y Chocolate

ÚLCERA GÁSTRICA Y DUODENAL

SUPLEMENTACIÓN FUNDAMENTAL:

- 1° **Comenzar tomando sólo Quassia durante 5 días y a partir del 6° comenzar el protocolo.** Para tomar Quassia hervir 3 cucharadas soperas rasas en ½ litro de agua, cuando rompa a hervir retirar del fuego y dejar reposar hasta enfriar, sirve para varias tomas.
- 2°
 - ◆ Programa de limpieza intestinal durante 5 semanas(sin cúrcuma y sin betaína)
 - ◆ Té de abedul (2 veces al día)+ cuando lleve 2 semanas añadir aceite de orégano (5 gotas en una capsula vacía 2 veces al día con la comida).
 - ◆ Quassia (Clark): Media cucharadita rasa de café antes de tres comidas.
 - ◆ Glutamina :2 cáps. 3 o 4 veces/día

Segue...

ÚLCERA GÁSTRICA Y DUODENAL (Continuación)

3º Recordatorio semanal:

- ◆ 3 cucharadas de tintura de nogal (Clark)
- ◆ Lugol (Clark), 6 gotas 4 veces ese día
- ◆ Aceite de orégano , 5 gotas 2 veces al día
- ◆ Realizar 2-3 limpiezas hepáticas (con 2-3 semanas entre si) y

Tomar al menos durante 4 semanas a diario:


- ◆ MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 1 ó 2 comidas
- ◆ Hydrangea (Clark): 1 cápsula con 2 ó 3 comidas (por posible acumulación en mucosa de amianto y HM)
- ◆ Glutamina (Clark): 2 cápsulas 3 ó 4 veces al día entre comidas (ayuda a la cicatrización)
- ◆ Hinojo (Clark): 3 desayuno, 3 comida, 3 cena
- ◆ Complejo B : 1 desayuno (la vit. B2 ayuda a eliminar el fenol)

Sigue...

ÚLCERA GÁSTRICA Y DUODENAL (continuación)

HOMEOGRAFÍAS (opcional):

- Estómago o duodeno
- Take out heavy metals riñones
- Take out HM 'L' riñones
- take out heavy metals (estómago o duodeno)



Sigue...

ÚLCERA GÁSTRICA Y DUODENAL (continuación)

ZAPPER (opcional) sólo 3 días a la semana, porque H.Pylory se esconde:

- 1º Zapper regular de 60 minutos (opcional)
- 2º Zapping plates estómago o duodeno: 20 minutos (opcional)
- 3º H.Pylory (opcional)

OBSERVACIONES:

Eliminar de la dieta:

- ◆ Alcohol
- ◆ Ácido acetilsalicílico
- ◆ Café
- ◆ Té
- ◆ Lácteos de todo tipo
- ◆ Grasas animales
- ◆ Fundamental revisión dental, con eliminación de metales y endodoncias.
- ◆ Eliminar fenol (alcohol monohidroxílico) por ser alérgeno del estómago, presente sobre todo en cremas faciales y corporales, humo de cigarros y alimentos ahumados

COLON IRRITABLE

(Siempre hay patógenos + alergia)

SUPLEMENTACIÓN:

- 1º
 - ◆ Programa de limpieza de intestino + olmo rojo : 2 cáp. en cada comida + ajeno.
 - ◆ Supositorio hecho con 3 semillas de albaricoque (5 días sí y 5 días no durante 4 semanas)

- 2º Desparasitación de áscaris +
 - ◆ Recordatorio Semanal, una vez por semana:
 - Tintura de nogal (Clark): 3 cucharadas soperas
 - Lugol (Clark): 6 gotas 4 veces al día
 - Cúrcuma (Clark): 6 desayuno, 6 comida, 6 cena
 - Hinojo (Clark): 6 desayuno, 6 comida, 6 cena
 - Aceite de orégano (Clark): 5 gotitas en cápsulas de gelatina vacías con una comida

- 3º Programa de detoxificación de metales pesados +IP6 (10 gotas una vez al día) y Realizar al menos 3,4 limpiezas hepáticas (1 cada 2,3 semanas) en esta fase de detoxificación de metales pesados.

Sigue...

COLON IRRITABLE

(Siempre hay patógenos + alergia)

HOMEOGRAFÍAS (importante):

- ◆ 3 partes de colon TAKE OUT NÍQUEL-COLON TAKE OUT NIQUEL HÍGADO
- ◆ Hígado TAKE OUT HM - COLON TAKE OUT HM HÍGADO

ZAPPER (optativo)

- ◆ Zapper regular de 60 minutos a diario
- ◆ Zapping plates: 3 partes de colon: 20 minutos a diario

A partir de la segunda semana añadir **ZAPPING PLATES:**

- 3 partes de colon - set vascular (1 ó 2 veces por semana)
- Hígado: 20' (1 ó 2 veces por semana)

OBSERVACIONES: eliminar alérgenos del cólon: pirrol (ahumados) y ácido acético (vinagre) además de gluten, lácteos y soja y, zappicar 10 minutos todos los alimentos antes de consumirlos para evitar alérgenos y formas "d" de aminoácidos.

Sigue...

Importante : beber agua procedente de destiladora.

ENFERMEDAD DE CROHN

Las lesiones suelen estar en una parte más alta del tracto digestivo (generalmente afecta la unión intestino delgado-intestino grueso) Suele haber implicados parásitos, bacterias y hongos

SUPLEMENTACIÓN: en caso de hemorragias durante 5 días dar sólo alginato sódico y olmo rojo hasta que no haya sangrado.

1/8 cucharadita de potasio + 4 gotitas de HCL (en cáps. vacía) +2 cucharadas de alginato sódico en 2 vasos de agua + 2 cucharadas de olmo rojo en agua 1 vez al día, entre comidas.

- 1º Programa de limpieza intestinal mas aceite de orégano (Clark) (5 gotitas en cápsulas de gelatina vacías con 2 comidas), + ajenojo. Eliminar cúrcuma si hay hemorragias.
 - 9 cápsulas de enzimas digestivas con cada comida + olmo rojo: 2 cucharaditas en cada comida
- 2º Desparasitación de áscaris.

ENFERMEDAD DE CROHN

3º Recordatorio semanal:

- ◆ Tintura de nogal (clark) 3 cucharadas soperas
- ◆ Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día
- ◆ Aceite de orégano (Clark) 5 gotas en cápsula de gelatina vacía con 2 comidas
- ◆ Cúrcuma (Clark): 6 desayuno, 6 comida, 6 cena(no , si hay hemorragias)
- ◆ Hinojo (Clark): 6 desayuno, 6 comida, 6 cena

4º Programa de detoxificación de metales pesados +IP6 (10gotas) + enzimas digestivas

Importante: realizar 2-3 limpiezas hepáticas (con 2-3 semanas entre sí) durante la detox. de metales pesados.

Podemos además añadir desde el principio:

- ◆ Vitamina C (Clark): 1 gramo en desayuno, 1 gramo en comida y 1 gramo en cena

ENFERMEDAD DE CROHN

HOMEOGRAFÍAS (importantes) Durante la detoxificación de HM :

- ◆ Colon ascendente + take out níquel - colon ascendente
take out HM - colon ascendente

- ◆ Intestino delgado + take out níquel - intestino delgado
take out HM - intestino delgado

ZAPPER: (OPCIONAL)

- ◆ Zapper regular de 60 minutos
- ◆ Zapping plates:
 - Colon ascendente 20'
 - Intestino delgado 20'
 - O bien los dos pegados 20'

ENFERMEDAD DE CROHN

OBSERVACIONES:

Evitar ahumados, vinagre, col, coliflor, coles de Bruselas, palmito, repollo, mostaza, guisantes, rábano, lácteos, naranjas, mandarinas, brócoli y cereales con gluten.

- Importante:**
- ◆ Zappicar los alimentos
 - ◆ Beber agua procedente de destiladora.

DIVERTÍCULOS

SUPLEMENTACIÓN:

- 1° Programa de limpieza intestinal + aceite de orégano (5 gotas en una capsula vacía con 2 comidas)+ olmo rojo :1 cucharadita en cada comida + ajeno.
- 2° Recordatorio semanal + Desp. de áscaris
 - ◆ Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas
 - ◆ Aceite de orégano 5 gotas en cap. Vacía con 2 comidas
 - ◆ Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día
- 3° Detoxificación de HM
 - +
 - A diario desde el principio:
 - ◆ Vitamina C (Clark): 1 gramo en desayuno, 1 gramo en comida y 1 gramo en cena
 - ◆ Extracto de té verde (Clark): 1 desayuno, 1 comida
 - ◆ Cúrcuma (Clark): 3 desayuno, 3 comida, 3 cena
 - ◆ Importante realizar después entre 4 y 6 limpiezas hepáticas

DIVERTÍCULOS

HOMEOGRAFÍAS (importantes) Durante la detoxificación de HM:

◆ Colon

TAKE OUT NIQUEL- COLON

◆ Colon skin non pigmented

TAKE OUT HM - COLON

O bien:

◆ Estómago

TAKE OUT NIQUEL - ESTÓMAGO

◆ Estómago skin non pigmented

TAKE OUT HM - ESTÓMAGO

O bien

◆ Intestino delgado

TAKE OUT NIQUEL - INTESTINO DELGADO

◆ Intestino delgado skin non pigmented

TAKE OUT HM - INTESTINO DELGADO

DIVERTÍCULOS

ZAPPER (opcional)

- ◆ Zapper regular de 60 minutos
- ◆ Zapping Plates:
 - Colon: 20'
 - Colon -skin non pigmented: 20'
 - Colon -set vascular(si es muy grave)

O bien:

- Estómago: 20'
- Estómago -skin non pigmented: 20'
- Estómago -set vascular

O bien:

- Intestino delgado: 20'
- Intestino delgado -skin non pigmented: 20'
- Intestino delgado -set vascular

OBSERVACIONES: importante zappar alimentos antes de consumirlos.

Evitar los alimentos que contengan los alérgenos : apiol y acido acético. (ahumados y vinagre).

HEPATITIS Y MONONUCLEOSIS HEPÁTICA

SUPLEMENTACIÓN:

- 1°
 - ◆ Programa de limpieza intestinal 4-5 semanas (con 6 cáps. de cúrcuma e hinojo en cada comida) + aceite de orégano 5 gotas en cáp. vacía con 2 comidas + boswelia: 2,2,2 en cada comida + Ajenjo.
 - ◆ Acido tiótico (Clark): 1 cápsula con de 2 ó 3 comidas
 - ◆ Glutatión: 1 o 2 cáps 10min. antes de cada comida
 - ◆ Hierbas para el hígado (Clark): 2 infusiones al día
- 2° Desparasitación de Ascaris + **Recordatorio semanal**
 - Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas
 - Aceite de orégano 5 gotas en cáp. vacía con 2 comidas
 - Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día

Sigue...

HEPATITIS (Continuación)

3° Repetir limpieza Intestinal 2 semanas

4° A diario durante al menos 3 meses:


- ◆ Escaramujo (Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena
- ◆ Selenio (Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena
- ◆ Hydránga (Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena
- ◆ Complejo B (Clark): 1 desayuno
- ◆ Cúrcuma (Clark): 3 desayuno, 3 comida, 3 cena
- ◆ IP 6 (Clark): 10 gotas antes de una comida
- ◆ Acido tiótico (1 en desayuno)
- ◆ MSM (Clark): 1 cáp. 15 minutos antes de 2 comidas
- ◆ Glutati3n: 1 cáp. en al menos una comida (lo ideal ser3a en las 3)
- ◆ Vit. C: 1 cáp. en cada comida
- ◆ Hierbas para h3gado
- ◆ Boswelias: 2 cáp. en cada comida
- ◆ Recordatorio semanal

Sigue...

HEPATITIS (Continuación)

HOMEOGRAFÍAS (Importantes sólo en hepatitis C):

- ◆ Hígado
- ◆ WBC
- ◆ Riñón
- ◆ Take out HM de:
 - Riñones
 - 'L' riñones
- ◆ Hígado / WBC




Sigue...


HEPATITIS (Continuación)

◆ Take out Azo dyes de:


- Riñones
- 'L' riñones



◆ Take out HM de Hígado



◆ Take out Azo dyes de Hígado



◆ Take out HM de WBC de Hígado



Sigue...

HEPATITIS (Continuación)

ZAPPER: (importante)

- ◆ Zapper regular de 60 minutos
- ◆ Zapping Plates:
 - Hígado: 20' (En plato derecho)

En casos graves deberíamos añadir:

- Zapping plates hígado-set vascular
- Homeografías ingeridas: Benzoquinona / hígado, glicoxal / hígado, ácido rodizónico / hígado, ácido glicoxílico / hígado.

Sigue...

HEPATITIS (Continuación)

OBSERVACIONES:

ES IMPORTANTE LA LUZ DE ESPECTRO TOTAL PEGADA A LA ZONA HEPATICA 15 MIN. 2 VECES AL DIA (sin ropa, directamente sobre la piel).

Evitar:

- ◆ Azúcar y productos que lo contengan
- ◆ Grasas saturadas
- ◆ Alcohol
- ◆ Café
- ◆ Té
- ◆ Zanahoria (por la umbeliferona que contiene)
- ◆ Zappicar los alimentos
- ◆ Beber agua procedente de destiladora

DIABETES TIPO 1

(Meses de duración) Parásitos + metanol (presente en casi todos los alimentos procesados, el agua embotellada y los refrescos) + oro (presente en alimentos, algunas piezas dentales, agua y suplementos nutricionales, joyería).

SUPLEMENTACIÓN:

- 1° Programa de limpieza intestinal(con 6 de cúrcuma e hinojo en cada comida) y aceite de orégano 5 gotas en cáp. vacía con 2 comidas + Ajenjo.
- 2° Limpieza renal + Recordatorio semanal:
 - ◆ Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas
 - ◆ Aceite de orégano 5 gotas en cáp. vacía con 2 comidas
 - ◆ Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día
- 3° Desparasitación de ascaris sin cisteína.

Sigue...

DIABETES TIPO 1 (Continuación)

DESDE EL INICIO:

- ◆ Vitamina B2 (Clark): 1 cápsula en desayuno (al menos durante 6 semanas). Ayuda a eliminar metanol
- ◆ Arginina (Clark): 1 cápsula a media mañana con estómago vacío (al menos durante 6 semanas). Ayuda a eliminar metanol
- ◆ Picolinato de cromo (Clark): 200 µg: 1 desayuno y 1 cena (ayuda a que la insulina entre en las células)
- ◆ Vitamina C (Clark): 1 gramo diario
- ◆ Magnesio (Clark): 1 comida (ayuda a eliminar el metanol)
- ◆ Complejo B (Clark): 1 desayuno (disminuye el riesgo de retinopatía) Tomar salvo durante Ascaris.
- ◆ Glutatión(Clark) : 1 en la cena
- ◆ Acido tiótico (Clark): 1 cáps. en desayuno, comida y cena (aumenta la sensibilidad a la insulina)
- ◆ MSM (Clark) : 1 cáps. de desayuno, comida y cena
- ◆ Vitamina B3 (Clark): 1 comida y 1 cena
- ◆ Coenzima Q10 (30 mg. Clark): 3 cápsulas desayuno, comida y cena (estimula la secreción y síntesis de insulina)

*Comenzar con limpiezas hepáticas (Clark)

Segue...

DIABETES TIPO 1 (Continuación)


HOMEOGRAFÍAS (importante):

- ◆ Páncreas
- ◆ Islotes de Langherhans
- ◆ Hígado
- ◆ Suprarrenales
- ◆ Riñones
- ◆ Insulina
- ◆ Take out HM de riñones

- ◆ Take out HM riñones-grupo 'L'

- ◆ Take out HM de páncreas

- ◆ Take out oro de páncreas



DIABETES TIPO 1 (Continuación)

ZAPPER (importante)

- ◆ Zapper regular de 60 minutos
- ◆ Zapping plates:
 - Páncreas: 20'. 1 ó 2 veces por semana páncreas - set vascular
 - Islotes: 20'
 - Hígado: 20'. 1 vez por semana hígado - set vascular
 - Adrenales: 20'

Sigue...

DIABETES TIPO 1 (Continuación)

OBSERVACIONES:

Evitar cualquier pieza de oro en contacto con la piel. Evitar fuentes de metanol:

- ◆ Agua de grifo o embotellada (Beber agua destilada procedente de destiladora)
- ◆ Edulcorantes artificiales (usar stevia)
- ◆ Refrescos con gas
- ◆ Alimentos enlatados, embotellados y precocinados
- ◆ Fuentes de Floridzina:
 - Amaranto y mijo crudos, manzana (salvo red y golden delicious, ambas muy maduras) cerdo y derivados, plátano, soja y derivados, frutas que no estén maduras, anacardo crudo, coliflor cruda, repollo crudo, calabacín crudo, leche y derivados, jalapeño, mango, aceite (maíz, canola, sésamo, soja), patatas fritas, hierba quassia.

DIABETES TIPO 1 (Continuación)

- Por supuesto azúcar y productos que lo contengan, además de los alimentos con alto índice glucémico (restringir el consumo de carbohidratos que no sean procedentes de verduras y hortalizas).

IMPORTANTE:

- ◆ Zappicar los alimentos.
- ◆ Luz de espectro en zona pancreática 15 min. 2 veces al día

DIABETES TIPO 2

SUPLEMENTACIÓN:

- 1º Programa de limpieza intestinal (con 6 cáps. de cúrcuma e hinojo en cada comida) y aceite de orégano
- 2º Desparasitación de áscaris.

- 3º Limpieza renal + Acido tiótico(Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena
Coenzima Q10. 30 mg. (Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena
+ recordatorio semanal

Terminada la limpieza renal realizar 4-5 limpiezas hepáticas (con 2-3 semanas entre si)

Picolinato de Cromo (Clark): 200mg 3 veces al día(evitar otros minerales en la misma comida)


- ◆ Vitamina C (Clark): 1 gramo diario
- ◆ Complejo B (Clark): 1 desayuno
- ◆ Acido tiótico(Clark): 1 caps. en desayuno , comida y cena
- ◆ MSM (Clark): 1 caps. en desayuno , comida y cena
- ◆ Coenzima Q10 (30 mg.) (Clark): 3 cápsulas desayuno, comida y cena

Sigue...

DIABETES TIPO 2 (Continuación)

HOMEOGRAFÍAS (Opcionales)

- ◆ Páncreas
- ◆ Islotes de langherhans
- ◆ Hígado
- ◆ Suprarrenales
- ◆ Riñones+
- ◆ Take out HM- riñones
- ◆ Take out HM-'L' riñones:
- ◆ Take out HM- páncreas
- ◆ Take out Oro- páncreas



Sigue...

DIABETES TIPO 2 (Continuación)

ZAPPER (importante)

- ◆ Zapper regular de 60 minutos
- ◆ Zapping plates:
 - Páncreas 20'
 - Opcional: Islotes de langherhans: 20'

OBSERVACIONES:

Mismas pautas alimenticias que en diabetes de tipo 1

Fundamental: zappicar alimentos antes de cada comida.

REFLUJO GASTROESOFÁGICO, HERNIA DE HIATO

SUPLEMENTACIÓN:

- 1º
 - ◆ Programa de limpieza intestinal y aceite de orégano (5 gotas en una cáp. vacía con 2 comidas) + Quassia u olmo rojo.
 - ◆ Recordatorio semanal:
 - Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas
 - Aceite de orégano
 - Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día
- 2º
 - ◆ Limpieza renal
 - ◆ Limpieza hepática: realizar 2 ó 3.

REFLUJO GASTROESOFÁGICO, HERNIA DE HIATO

HOMEOGRAFÍAS (opcional):

- ◆ Lower oesophagus
- ◆ Oesophagus-stomach junction

ZAPPER (opcional):

- ◆ Zapper regular de 60 minutos
- ◆ Zapping plates:
 - Lower oesophagus: 20'
 - Oesophagus-stomach junction: 20'

CIRROSIS


SUPLEMENTACIÓN:

- ◆ Ácido tiótico (Clark): 1 cápsula antes de desayuno, comida y cena
- ◆ Complejo B (Clark): 1 en desayuno
- ◆ Vitamina C (Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena
- ◆ Glutación (Clark) : 1 cáps. en desayuno , comida y cena
- ◆ Hierbas para el hígado (Clark): 2 infusiones diarias

CIRROSIS

HOMEOGRAFÍAS (opcional):

- ◆ Hígado
- ◆ Take out HM- riñones:
 - Take out HM-'L' riñones:
 - Take out HM-hígado



ZAPPER (importante):

- ◆ Zapper regular de 60 minutos
- ◆ Zapping plates:
 - Hígado – Set vascular

EVITAR ALIMENTOS CON UMBELLIFERONA.

HEMOCROMATOSIS

SUPLEMENTACIÓN:

Pasos a seguir:

1. Desparasitación de áscaris + tintura Liver Glow (2 goteros 3 veces/día) o hierbas para el hígado.
+ MSM + Ácido tiótico
2. Limpieza intestinal + Tintura Liver Glow + MSM + Ácido tiótico o hierbas para el hígado.
3. Detoxificación de metales pesados +Tintura Liver Glow + Realizar de 4 a 8 limpiezas de hígado.
+ Extracto de té verde: 1,1,1 + complejo B: 1 desayuno + MSM: 1,1,1 + Ac.Tiótico: 1,0,1 + Vit.C: 1,1,1

HOMEOGRAFÍAS:

- ◆ Take out HM/hígado; take out HM/páncreas

INFORMACIÓN ADICIONAL

LIBROS DE INTERES

Para cualquier pregunta sobre
La Terapia Clark contacte
con nosotros en:

info@clarktherapyon-line.com

